

SYNOPSIS

DES ESPÈCES DU GENRE PAROPSIS

PAR

le docteur **F. CHAPUIS**

— SÉANCE DU 4 AOUT 1877 —

Le Catalogue de MM. Gemminger et Harold énumère 132 espèces du genre *Paropsis*; ce nombre déjà considérable sera doublé et au delà par les recherches que nous venons de terminer et dont nous avons l'honneur de présenter le résultat à la Société entomologique belge (1).

Toutes les formes que nous avons eues sous les yeux, au nombre de 226, ont été rangées en quatre groupes caractérisés par la sculpture des élytres.

Ces groupes primaires se prêtent à leur tour à des divisions ultérieures, mais, vu les limites d'un synopsis, nous les passerons sous silence.

PREMIER GROUPE.

Les élytres présentent une ponctuation confuse et les intervalles qui séparent les points les uns des autres, sont tantôt unis, tantôt relevés en granulations plus ou moins saillantes, plus ou moins serrées. Les bords latéraux du pronotum sont entiers, ou bien ils offrent dans leur milieu une échancrure plus ou moins profonde.

Dans ce groupe se rencontrent les espèces les plus grandes et presque toutes sont d'un jaune ferrugineux.

1. *variolosa*. Marsham.

(1) Cet accroissement est surtout dû à l'étude de la riche collection de M. le comte de Castelnau, dont j'ai fait l'acquisition.

2. **tasmanica**. Baly.

3. **Wiloni**. Baly. (*testacea*. Germar).

4. **Waterhousei**. Baly.

5. **aciculata**, n. sp. Australie.

Late ovata, convexa, flavescens; pronoto parce inæqualiter punctato, versus latera fortiter punctato-ruguloso; angulis anticis extrorsum acutis; elytris parce et subtiliter fusco-punctatis, summo disco læviusculo, tenuiter flexuose striatis, interspatiis tenuissime subradiatim strigillatis. Long. 14-15 millim.

6. **nigroscutata**, n. sp. Australie.

Late ovata, convexa flavescens; capitis vertice nigro, antennis nigris, articulis duobus primis flavis; pronoto parce et tenue punctato, versus latera concavo-depresso, profundius punctato, lateribus fere rectis, ad apicem abrupte incurvis et mucronatis; scutello nitido, nigro; elytris moderate fusco-punctatis, interstitiis versus apicem subelevatis; subtus flavescens, pectoris suturis nigris, pedibus flavis, femoribus supra nigris, tibiis basi et apice tarsisque nigro-variegatis. Long. 12 millim.

7. **pictipes**, n. sp. Australie.

Breviter ovata, convexa, late flava, antennis nigris, basi flavis; capite tenue punctato-rugoso, pronoto disco subtransversim ruguloso, parce punctato, versus latera punctis latis, parum profundis; lateribus rotundatis, angulis anticis breviter mucronatis; elytris parcius sat profunde punctatis, punctis hinc et inde infuscatis; subtus flava, femoribus et tibiis apice nigris, tarsis nigro-variegatis. Long. 11 millim.

8. **reticulata**. Marsham.

9. **dilatata**. Erichson.

10. **crocata**. Boisduval.

11. **fulvo-guttata**. Baly.

12. **rufitarsis**, n. sp. Australie.

Breviter ovalis, convexa, flava; antennis versus apicem subincrassatis, nigris, articulis primis flavescentibus; pronoto convexo, versus latera non depresso, subtiliter et parcius punctato, punctis ad latera majusculis; elytris parce et medioeriter punctatis, interspatiis subtilissime punctatis, tibiis apice et tarsis rufis. Long. 7-9 millim.

13. **atomaria**. Marsh. (*Charybdis* Stal).

14. **marmorea**. Olivier.
15. **maculata**. Marsh.
16. **geographica**. Baly.
17. **lutea**. Marsh.
18. **consimilis**. Baly.
19. **propinqua**. Baly.
20. **carnosa**. Baly.
21. **roseola**. Baly.
22. **obsoleta**. Oliv.
23. **porosa**. Erichs.
24. **paphia**. Stål.
25. **ornata**. Marsh.
26. **irrotata**. n. sp. King George Sound.

Ovalis, convexa, flavo-testacea; pronoto tenue sat crebre punctulato, versus latera subrotundatim depresso, fortius punctato, lateribus ante medium subrectis, angulis acutiusculis, flavo-subviridi, fusco-maculato; elytris subnitidis, postice subdilatatis, sat dense inæqualiter fusco-punctatis. Long. 9 mm.

27. **formosa**, n. sp. Sydney.

Breviter ovata, convexa, pallide flava, antennis longioribus, dimidiam longitudinis partem superantibus, subinfuscatis; capitis vertice nigro; pronoto latiori, sat dense subtiliter punctato, ad latera profunde et late impresso, punctato-ruguloso; lateribus a basi ad medium rectis, dein bisinuatis, angulis mucronatis; scutello punctis nonnullis impresso; elytris latis, sat dense et profunde fusco-punctatis, interspatiis subpunctulatis, versus apicem convexioribus, plagis albedo-flavis, hinc et inde ornatis costaque obliqua in disco postico concolore; subtus pallide flava, pectoris suturis nigricantibus, abdominis segmentis utroque latere nigro-plagiatis; pedibus flavis, femoribus anticis antice, quatuor posticis postice nigro-plagiatis. Long. 12 mm.

DEUXIÈME GROUPE.

Dans cette division, la ponctuation n'est ni entièrement confuse, ni entièrement régulière; habituellement les élytres présentent trois ou quatre lignes longitudinales à peu près lisses et limitées sur chaque bord par une série de points alignés; entre ces lignes les points sont disséminés sans ordre.

Ces lignes lisses ne sont pas toujours très apparentes et parfois se réduisent à une seule qu'il faut rechercher attentivement.

Cette disposition spéciale de la ponctuation coïncide avec une forme générale particulière; toutes les espèces, ou peu s'en faut, sont globuleuses, très convexes, lisses; le bord latéral des élytres est tombant et non relevé.

28. **Circe**. Stål.

29. **picea**, Oliv. (*atropos* Stål, *biplagiata* Boh.).

30. **Ståli** n. sp. Rockhampton.

Rotundata, convexa, rufo-testacea; fronte canaliculata; pronoto parcius punctato, punctis minutis intermixtis; ad latera depresso, densius et fortius punctato; angulis anticis obtusis; elytris parcius punctatis, cum lineis quatuor lævibus; rufo-ferrugineis, plaga magna et lineola laterali nigris; lineola ab apice ad medium extensa; plaga lineolis duabus flavis ornata, altera discoïdali, utrinque abbreviata, altera subsuturali, in discum plus minusve interrupta. Long. 11 mm.

31. **bipuncticollis**, n. sp. Australie.

Rotundata, convexa, obscure rufo-testacea; pronoto undique parce et subtiliter punctato, punctis versus latera paulisper majoribus; lateribus vix rotundatis, angulis anticis obtusis, maculis duabus parvis nigro-fuscis in disco; elytris sat dense et fortiter fusco-punctatis, lividis, cum sutura anguste et margine externo late rufo-brunneis; lineis quinque lævibus pallide flavis ornatis, prima scutellari abbreviata, 2 et 5 a basi ad apicem extensis et postice connexis, 3 pone medium abbreviata, 4 pone humerum orta, præcedente longiori. Long. 11 mm.

32. **umbrata**, n. sp. Rockhampton.

Rotundata, convexa, ferruginea, brunneo-variegata; pronoto punctis inæqualibus sat densis; ad latera impresso, punctis majoribus et congestis notato; elytris sat fortiter moderate fusco-punctatis, interspatiis punctulatis; lineolis lævibus quinque, prima scutellari brevi, ornatis; colore variabili, fusco ferrugineoque variegato. Long. 11 mm.

33. **contracta**, n. sp. Rockhampton.

Rotundata, antice obtusa, convexa, ferrugineo-brunnea; pronoto punctis sat grossis et minutis intermixtis, disco medio læviusculo, ad latera depresso et ruguloso-punctato; elytris sat dense punctatis lineolis quatuor lævibus et lineola brevi suturali subobsoleta ornatis; obscure brunneis cum marginibus anticis et lateralibus ferrugineo-tinctis; corpore subtus nigricante, pedibus ferrugineis. Long. 10 mm.

34. abdominalis, n. sp. Murrumbidgee River.

Rotundata, convexa, ferruginea; pronoto parce inæqualiter punctato; ad latera vix distincte impresso, punctis majoribus et confertis notato; elytris sutura anguste nigra, sat dense fusco-punctatis, cum lineolis lævibus quatuor, externis duabus vix perspicuis; corpore subtus nigro cum pedibus et abdominis latiori limbo ferrugineis. Long. 10 mm.

35. pedestris, n. sp. Wide Bay.

Subrotundata, convexa, flavescens; pronoto tenue punctato, versus latera non impresso, densius profundiusque punctato; elytris moderate punctatis, lineis quatuor lævibus vix distinctis; sutura et margine basali anguste, puncto humerali, scutelli limbo nigricantibus; corpore subtus cum pedibus subflavo, femorum apice, tibiarum apice et basi, tarsisque nigris. Long. 8 mm.

36. globata, n. sp. Queensland.

Breviter ovata, convexa, testacea; pronoto inæqualiter et irregulariter sat dense punctato, ad latera subimpresso, punctato ruguloso; elytris moderate fusco-punctatis, lineolis quinque lævibus, sat distinctis ornatis; corpore subtus ferrugineo, brunneo-variegato; pedibus testaceis. Long. 9 mm.

37. rubeola, n. sp. Adelaïde.

Subrotundata, valde convexa, rufo-testacea; pronoto convexo, tenuissime punctulato, ad latera non impresso, densius profundiusque punctato, punctulis minutis multis intermixtis; elytris densius et fortiter punctatis, interspatiis minute punctulatis lineolis quatuor sublævibus distinctis; rufo-ferrugineis; corpore subtus concolore. Long. 8 mm.

38. hemisphærica, n. sp. Australie.

Hemisphærica, valde convexa, rufo-ferruginea; pronoto ad latera subimpresso, undique sat dense et fortiter punctato; scutello punctis nonnullis ornato; elytris crebrius subfusco-punctatis, lineolis quatuor ægrè perspicuis, undique, interspatiis et lineolis, sat dense punctulatis; corpore subtus nigro, abdominis apice et pedibus ferrugineis. Long. 7-8 mm.

39. globulosa, n. sp. Australie.

Hemisphærica, convexa, rufo-ferruginea; capitis vertice nigro; pronoto dense et fortiter punctato, ad latera subimpresso et punctis majoribus congestis; scutello punctulato; elytris valde convexas, sutura anguste nigra, sat dense et mediocriter punctatis, interspatiis punctulatis, lineolis sublævibus, ægrè discernendis; corpore subtus nigro, abdominis apice et pedibus ferrugineis. Long. 5-6 mm.

40. **semipunctata**, n. sp. Clarence-River.

Breviter ovalis, brunnea; capite fortiter punctato, punctis longitudinaliter subconfluentibus; pronoto dorso brevi, vel parcissime subtilissimeque punctulato; ad latera impresso, parce profundius punctato; elytris versus apicem subdilatatis et convexioribus, nitidis, profunde punctatis, punctis vel foveolis raris, hinc et inde subseriatis; disco subimpunctato; corpore subtus nigro, undique rufo-brunneo marginato. Long. 9-10 mm.

41. **hastata**, n. sp. King George Sound.

Breviter ovata, convexa, subtus cum pedibus nigra, nitida, supra rufo-brunnea, nigro-variegata; pronoto medio læviusculo; ad latera non impresso, punctulato, disco utrinque macula parva rotundata ornato; scutello rufo-brunneo; elytris parce et subtiliter punctatis interspatiis minute punctulatis, lineolis quatuor sublævibus; rufo-brunneis, cum sutura in medio abrupte dilatata, ante apicem attenuata nigra; macula basali juxta scutellum postice emarginata, macula humerali, fascia in medio v-formi et macula ante apicem oblonga nigris. Long. 7 mm.

42. **subovalis**, n. sp. Carpentaria.

Suboblonga, subconvexa, piceo-brunnea; capite dense punctato; pronoto tenue et parcius punctulato, ad latera non impresso, dense et fortiter punctato; elytris oblongis, dense et profundius punctatis, interstitiis punctulatis, lineolis duabus sublævibus distinctis; corpore subtus nigro, abdominis segmentis utrinque rufo-maculatis, pedibus rufis, prosterno convexo, basi subsulcato. Long. 10 mm.

43. **oblonga**, n. sp. Port Curtis.

Oblonga, subconvexa, brunnea; pronoto disco medio tenuissime punctato, juxta basim et marginem anticum punctato; ad latera non impresso, dense et fortiter punctato; elytris oblongis, parcius et profunde punctatis, punctis juxta suturam substriatis, lineola sublævi discoïdali unica; corpore subtus nigro, abdominis segmento ultimo rufescenti, pedibus rufis; prosterno convexo. Long. 12 mm.

44. **æraria**, n. sp. Rockingham Bay.

Subrotundata, convexa, viridi-ænea; capite punctato-rugoso, antennis brevibus fuscis, basi flavis; pronoto parcius et subtilissime punctulato, basi apiceque punctulis nonnullis majusculis, ad latera punctis majoribus confertis et obsolete impresso; elytris punctatis, punctis profundis, versus marginem subdensus et partim subseriatis, in parte discoïdali rarissimis, punctulis nonnullis intermixtis; corpore subtus cum pedibus viridi-æneo; tarsis rufescentibus. Long. 13 mm.

45. **foraminosa**, n. sp. Rockhampton Bay.

Breviter ovalis, convexa, rufescenti-ænea; pronoto parce subtilissimeque punctulato, basi et apice punctis majusculis nonnullis ornato; ad latera subimpresso, parce punctato, viridi-æneo, lateraliter rufo-limbato; elytris viridi-æneis, rufescenti-marginatis, punctis raris, profundis, partim seriatim dispositis, partim inordinatis, seriebus decem, prima brevi, secunda subsuturali, aliis octo geminatis; corpore subtus rufescenti, in medio, femoribusque æneo-indutis. Long. 9 mm.

46. **perplexa**, n. sp. Adelaïde.

Oblongo-ovalis, convexa, testacea; pronoto parce et subtiliter punctato, ad latera punctis nonnullis fortiter impressis; elytris punctatis, punctis ad suturam minutis subordinatis, versus latera et apicem profunde impressis et confusis, interspatiis subtilissime punctulatis, interstitiis quatuor plus minusve abbreviatis, sublœvibus, 1^o latiusculo, punctis subinfuscatis; elytris ante apicem obscuris et utrinque ante medium maculis 3 vel 4 notatis. Long. 6 mm.

TROISIÈME GROUPE.

Cette division est de beaucoup plus nombreuse. Les élytres présentent constamment dix séries longitudinales de points, plus ou moins régulières, plus ou moins apparentes; de ces séries, la première, située près de l'écusson, est toujours très courte.

La forme, la taille et la coloration varient beaucoup et peuvent servir à l'établissement de subdivisions nombreuses.

47. **morio**. Fabricius.48. **nigerrima**. Germar.49. **tenebrosa**, n. sp. Port Denison.

Elliptica, moderate convexa, nigra; frontis medio, elytrorum limbo pedibusque rufo-translucentibus; pronoto tenuiter sat dense punctulato, versus latera punctis nonnullis majoribus, fossulaque parva ornato; elytris moderate punctato-striatis, interstitiis punctulatis. Long. 8 mm.

50. **stygia**, n. sp. Melbourne.

Breviter ovata, convexa, nigra, nitida; frontis medio, pronoti margine antico, antennarum basi flavo-rufescentibus; pronoto densius et tenue punctulato, ad latera fortiter sat dense punctato foveolaque minuta rotundata impresso; elytris posterius subampliatis, tenuissime punctato-striatis, interstitiis itidem punctulatis. Long. 9 mm.

51. **Iris**, n. sp. Ile de l'Éclipse.

Elliptica, dorso subdepresso, nigro, supra nitore metallico viridi vel violaceo induta; pronoto tenue et parce punctulato, ad latera punctis majoribus nonnullis ornato, subdepresso; elytris punctato-striatis, interstitiis densius punctulatis, versus apicem moderate convexis. Long. 13 mm.

52. **fallax**. Newman.53. **vittipennis**. Boh.54. **alternata**. Germ.55. **lineata**. Marsh.56. **beata**. Newman.57. **rubrosignata**. Boh.58. **sempustulata**. Marsh.59. **octosignata**. Stål.60. **mera**, n. sp. Port Denison.

Breviter ovalis, convexa, obscure rufo-picea; capite sat dense punctato; pronoto parcius subtiliusque punctulato, ad latera torulosa et flavescencia impresso et grosse punctato; elytris moderate punctato-striatis, interstitiis punctulatis versus apicem subconvexis, piceis, rufo-limbatis et maculis tribus in utroque rufo-flavis, fusco-punctatis ornatis. Long. 11-12 mm.

61. **picta**, n. sp. Australie.

Ovalis, subconvexa, piceo-nigra; capite punctato, macula quadrata rufa; pronoto dense et fortiter punctato, ad latera flavescencia et torulosa impresso et grosse punctato; disco macula magna transversa, antice emarginata ornato; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis subtilissime punctulatis, nigris, maculis tribus flavis ornatis, prima subbasali, transversa, interdum interrupta; duabus pone medium, inæqualibus. Long. 10 mm.

62. **complexa**, n. sp. Ile de l'Éclipse.

Late ovata, convexa, rufo-picea; capite punctis minutis et majusculis, rufescente, vertice nigro, rufo-maculato; pronoto tenuiter et parce punctato, ad latera torulosa et flavescencia foveolato punctisque majoribus impresso; elytris distincte punctato-striatis, interstitiis punctulatis, lineolis quatuor a basi ad apicem maculisque tribus flavis vel rufo-flavescentibus ornatis. Long. 11 mm.

63. **rufipes**. Fabr.64. **circumdata**. Newm.65. **Cloelia**. Stål.

66. **agricola**, n. sp. Tasmanie.

Breviter obovata, nigra; capite subtiliter punctato, flavo-ferrugineo, dimidia postica parte nigra; pronoto dense et fortiter ruguloso-punctato, ad latera profunde lateque impresso, rugoso, marginibus antico et lateralibus anguste flavis; elytris postice subampliatis, margine laterali sat dilatato, anguste flavo, substriato-punctatis, seriebus flexuosis, subirregularibus, interstitiis sat dense punctulatis; corpore subtus cum pedibus nigro-piceo, coxis, genubus tarsisque flavescens. Long. 7-8 mm.

67. **flavitaris**, n. sp. Tasmanie.

Elliptica, subdepressa, nigra; pronoto parce et subtiliter punctato, ad latera punctis majoribus subconfertis et foveola parva rotundata, nigro cum margine laterali pallide flavo; elytris distincte punctato-striatis, interstitiis punctis majoribus subseriatim et punctis minutis sparsis impressis; margine laterali flavo-luteo; corpore subtus nigro, abdominis lateribus et tarsis flavo-luteis. Long. 4 mm.

68. **ornaticollis**, n. sp. Victoria.

Flava, obovata, convexa, capite punctato, vertice et linea media longitudinali nigris; pronoto inæqualiter irregulariterque punctato, ad latera profunde foveolato profundiusque punctato, maculis tribus nigris subrotundatis ornato; elytris pallide flavis, profunde punctato-striatis; interstitiis omnibus fortiter et parce punctatis, punctis minutis intermixtis, 2, 4, 6, 8, 10 piceo-nigris. Long. 10 mm.

69. **conjugata**, n. sp. Adélaïde.

Obtuse ovata, rufo-ferruginea; pronoto parce subtiliterque punctato, macula utrinque fusco-diffusa, ad latera foveola subrotundata, profunda punctisque nonnullis grossis ornato; elytris dorso subdepressis, profunde punctato-striatis, interstitiis omnium subtilissime punctulatis, interstitiis 2, 4, 6, 8, striisque 1 et 10 fusco-nigris. Long. 12 mm.

70. **intacta**, Newm.

71. **subcostata**, n. sp. Tasmanie.

Elliptica, depressiuscula, rufo-castanea; pronoto fortiter denseque punctato, subruguloso, ad latera foveola rotundata et tuberculo basali obtuso ornato, rufo-castaneo, foveola et tuberculo piceis, margine laterali late flavo; elytris profunde striato-punctatis, interstitiis valde convexis, punctulatis, brunneis, stria decima picea, margine late flavo. Long. 9-10 mm.

72. **trimaculata**, n. sp. Australie.

Ovalis, paulisper convexa, postice subampliata; capite tenue punctulato, vertice lineaque media longitudinali bifurcata nigris; pronoto dense punctulato, nigro-trimaculato, ad latera profunde foveolato et punctato; elytris mediocriter striato-punctatis, interstitiis subconvexis, punctulatis flavo-ferrugineis; striis punctatis, nigris; corpore subtus nigro, pedibus ferrugineis. Long. 10-11 mm.

73. **gemina**, n. sp. Adelaïde.

Ovalis, subconvexa, piceo-nigra; capite nigro, punctulato, macula verticis rufa; pronoto tenue æqualiter punctato; ad latera foveolato et punctis nonnullis majoribus impresso, rufo-brunneo, juxta basin macula magna transversa, piceo-nigra, ante scutellum rufo-bimaculata; scutello nigro; elytris fortiter punctato-striatis interstitiis parce punctulatis, brunneis, striis punctatis nigris; corpore subtus cum pedibus nigro-nitido. Long. 10 mm.

74. **nigro-vittata**, n. sp. Australie.

Breviter ovalis, convexa, testacea; pronoto parce subtiliter punctato, ad latera profundius punctato et late impresso; elytris mediocriter punctato-striatis, interstitiis punctulatis, striis punctatis nigris. Long. 10 mm.

75. **basalis**, n. sp. Sidney.

Obovata, convexa, testacea; pronoto dense et fortiter, sat regulariter punctato, ad latera subdepresso et ruguloso; scutello punctis nonnullis impresso; elytris posterius subampliatas sat profunde striato-punctatis, interstitiis moderate convexis, fortiter denseque punctatis, striis pone basin, 1 et 10 exceptis, colore livido tinctis. Long. 10 mm.

76. **variabilis**, n. sp. Adelaïde.

Ovalis, convexa, flavo-testacea; capite tenue punctulato, fronte fusco-maculato, suturis epistomatis fuscis; pronoto dense subtilissimeque punctulato, ad latera late subdepresso, profundius punctato; scutello nigro-marginato; elytris mediocriter punctato-striatis, striarum punctis fasciisque duabus macularibus nigris, altera pone basin, altera pone medium, interdum subobsoletis, interstitiis tenuiter punctulatis. Long. 11-12 mm.

77. **trivittata**, n. sp. Gipsland.

Obovata, convexa, rufo-brunnea; pronoto parce et subtilissime punctulato, ad latera parce punctato, profunde foveolato, rufo-brunneo, disco nigro-adumbrato; elytris subampliatas, subtiliter punctato-striatis, interstitiis punctulatis, rufo-brunneis cum vittulis tribus sat latis, nigris, a basi ad apicem, ornatis; corpore subtus cum pedibus nigro, tibiærum basi rufescente. Long. 9 mm.

- 78. **Clotho**. Stål.
- 79. **brunnea**. Marsh.
- 80. **nucea**. Erichson.
- 81. **irrisa**. Newman.
- 82. **liturata**. Marsh.
- 83. **erudita**. Newman.
- 84. **minor**. Marsh.
- 85. **octo-maculata**. Marsh.
- 86. **inspersa**. Newman.
- 87. **remota**. Germ.
- 88. **pluvialis**, n. sp. Sydney.

Ovalis, convexa, pallide testacea; capite parce punctato, vertice obscuro; pronoto subtilissime punctato, ad latera punctis majoribus nonnullis notato, vix depresso; scutello fusco; elytris subtiliter punctato-striatis, punctis nigris, aliis majoribus, aliis minutis, punctis marginalibus etiam nigris; corpore subtus testaceo, pectore fusco; abdominis segmentis utrinque fusco-maculatis, pedibus ferrugineis. Long. 6 mm.

- 89. **stictica**. Marsh.

- 90. **nigrostillata**, n. sp. Victoria.

Ovalis, convexa, pallide flava; capite parce punctato; pronoto parce et subtiliter punctulato, ad latera subdepresso et punctis nonnullis majoribus notato; scutello nigro-limbato; elytris subtiliter punctato-striatis, undique subtilius et subdense punctulatis, striarum punctis nonnullis magnis, foveolatis et nigris; corpore subtus pallido, pedibus nigris, tibiæ basi excepta. Long. 7 mm.

- 91. **umbrosa**, n. sp. Sydney, Nouvelle Galles du Sud.

Ovalis, convexa, flavo-testacea; pronoto parce inæqualiter punctato, ad latera subdepresso, sat dense et fortiter punctato; elytris distincte punctato-striatis, interstitiis parce et subtilius punctatis, striarum punctis fuscis, maculis inæqualibus intermixtis; hinc et inde majoribus et confluentibus; sæpius fascia obliqua maculari pone medium distincta; corpore subtus cum pedibus testaceo-flavo. Long. 5 mm.

- 92. **notatipennis**, n. sp. Sydney.

Ovata, convexa, pallide testacea; pronoto sat dense subinæqualiter punctato, utrinque versus latera foveolato et confertim punctato; elytris distincte punctato-striatis, punctis fuscis, interstitiis punctulatis, fasciis duabus nigris, macularibus, ornatis, altera

semi-circulari ab humero ad humerum, altera pone medium strio-laque sublaterali versus apicem concolore. Long. vix 5 mm.

93. **interstincta**. Clark.

94. **transverso-maculata**. Clark.

95. **nigro-conspersa**. Clark.

96. **anxia**, n. sp. King George Sound.

Ovalis, convexa, rufo-testacea; pronoto parcius subtiliter punctulato, ad latera vix depresso et punctis nonnullis majoribus notato; elytris posterius subattenuatis, profunde punctato-striatis, in declivitate ad saturam distincte depressis; interstitiis sparsim punctulatis, versus apicem subconvexis et maculis nigris irregularibus ornatis. Long. 8 mm.

97. **orphanula**, n. sp. Tasmanie, Melbourne, Gipsländ.

Oblonga, subconvexa, rufo-testacea; capite sublævi; pronoto parce subtiliterque punctulato, ad latera subfoveolato et punctis profundis notato; elytris fortiter punctato-striatis, seriebus subflexuosis, interstitiis latitudine inter se inæqualibus, subtiliter punctulatis, 1 ad suturam, 4, 6, 8 vel omnino vel basi et apice rufo-fuscis. Long. 6 mm.

98. **delicatula**, n. sp. Tasmanie, Adelaïde.

Ovata, depressiuscula, pallide flava; capite parce fortiter punctato; pronoto sublævi, ad latera foveolato et punctis profundis confertis impresso; macula discoïdali majuscula maculisque minutis lateralibus diffuse fuscis, notato; elytris dorso subdepressis, distincte punctato-striatis, lineola laterali irregulari et fasciis macularibus quatuor fuscis ornatis; subtus pectore et abdomine fusco-nigris, pedibus ferrugineis. Long. vix 3 mm.

99. **obovata**, n. sp. Sydney, Tasmanie, Gipsländ.

Breviter obovata, convexa, supra testacea; capitis vertice infuscato; pronoto parce inæqualiter punctato, ad latera late depresso, densius profundiusque punctato, signaturis fuscis ornato; scutello fusco-limbato; elytris postice subdilatis, distincte substriato-punctatis, punctis subirregulariter ordinatis; interstitiis paulisper convexis, punctulatis; corpore subtus cum pedibus nigro, femorum et tibiærum basi flavescente. Long. 6-7 mm.

100. **vulgaris**, n. sp. Clarence River, Victoria, Wide-Bay, Brisbane.

Breviter obovata, convexa, supra testacea; capite punctato, linea media longitudinali antice bifurcata fusca; pronoto parce et subtiliter irregulariterque punctato, ad latera depresso et fortiter

parum dense punctato, supra fusco cum signaturis flavo-subauratis; elytris moderate punctato-striatis, interstitiis parcissime punctulatis, margine laterali fortiter fusco-punctato; corpore subtus cum pedibus nigro, femorum basi flavescente. Long. 6-7 mm.

101. **hectica**. Boisd. Tasmanie, Victoria.

Breviter ovata, convexa, flavo-testacea; capite punctato; pronoto sat dense fortiterque punctato, ad latera subfoveolato punctisque nonnullis profundis impresso; elytris postice subampliatis, distincte punctato-striatis, interstitiis punctulatis, striarumque 1 et 10 punctis fuscis; sæpius sutura et margine basali plus minusve flavo-lividis; corpore subtus nigro, abdomine pedibusque ferrugineis, femorum apice nigro-maculato; interdum (apud ♀?) corpore subtus cum pedibus flavo-ferrugineo. Long. 7-8 mm.

102. **citrina**, n. sp. Sydney.

Breviter ovata, flavo-citrina; capitis vertice nigro; pronoto subinæquali, parcius et subtiliter punctato, ad latera distincte lateque depresso, punctato-rugoso; scutello nigro-limbato; elytris subtiliter punctato-striatis, punctis minutis nigris, subregulariter seriatis, interstitiis parce punctulatis; marginis lateralis punctis etiam minutis; corpore subtus nigro, femorum basi pallide flavo. Long. 8 mm.

103. **æqualis**, n. sp. Gipsland.

Ovalis, minus convexa, supra testacea; pronoto subtilissime et parce punctato, ad latera punctis nonnullis majoribus foveolaque parva, profunda et rotundata ornato; elytris nitidis, punctato-striatis, interstitiis parce punctatis; punctis striarum, interstitiorum et marginis lateralis æqualibus, minutissimis, nigris; corpore subtus flavo, pedibus nigris, tibiis obscure flavis. Long. 8 mm.

104. **deflorata**, n. sp. King George Sound.

Ovalis, convexa, albido-flavescens; capitis vertice nigro; pronoto parce subtiliterque punctato, ad latera distincte foveolato et punctato rugoso; maculis nonnullis parvis notato; elytris subtiliter punctato-striatis, punctis nigris, interstitiis parce et subtilissime punctulatis, versus apicem subconvexis; corpore subtus cum pedibus nigro, tibiis obscure luteis. Long. 9 mm.

105. **elliptica**, n. sp. King George Sound.

Elliptica, convexa, supra testacea; capite inæqualiter punctato, flavo-rufescente, vertice obscuro; pronoto sat dense subtiliter punctulato, ad latera distincte foveolato punctisque nonnullis majusculis, confluentibus ornato; elytris subtiliter punctato-striatis, punctis fuscis, oblongiusculis, interstitiis subconvexis,

punctulatis, punctis in series duas dispositis, aliis sparsis; corpore subtus cum pedibus nigro, tibiis obscure testaceis. Long. 10 mm.

106. **maculicollis**. Clark.

107. **pachyta**, n. sp. Sydney.

Breviter ovalis, valde convexa, rufo-testacea; capite tenue et dense punctato; pronoto parcius, vix distincte punctulato, ad latera late depresso et punctato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis tenuiter et sat dense punctulatis; corpore subtus cum pedibus pallide testaceo. Long. 10 mm.

108. **flaveola**, n. sp. Port Denison.

Breviter ovata, convexa, flavo-citrina; pronoto parcissime subtiliter punctulato, ad latera subimpresso et punctis majoribus confluentibus notato; elytris distincte punctato-striatis; punctis impressis, fusco-nigris, remotis; corpore subtus cum pedibus pallide flavo. Long. 6 mm.

109. **albicans**, n. sp. Queensland.

Ovata, viridi-alba; capite punctulato, medio longitudinaliter punctulato; pronoto tenue inæqualiter punctulato, ad latera impresso et fortius punctato, albido-virescente cum signaturis lividis et profundius punctatis; elytris punctato-striatis, seriebus primis subtilioribus, punctis primæ et decimæ nigris; interstitiis dense punctulatis. Long. 7 mm.

110. **interstitialis**, n. sp. Australie.

Ovata, testacea; capite tenuiter sat dense punctulato; pronoto inæquali et inæqualiter sat dense punctato, ad latera oblique depresso et profundius punctato-rugoso; elytris distincte punctato-striatis, interstitiis punctatis, punctis in utrisque æqualibus, profundis et fusco-nigris. Long. 7 mm.

111. **proxima**, n. sp. Queensland.

Ovata, testacea; capite tenuissime punctulato; pronoto æquali, dense subtiliterque punctulato, ad latera late et leviter impresso, punctis majoribus nonnullis notato; elytris distincte punctato-striatis, punctis discretis, interstitiis densissime punctulatis, humeris nigro-fuscis. Long. 9 mm.

112. **incerta**. Chp. *testacea*. Marsham.

113. **testacea**. Olivier.

114. **debilis**, n. sp. Tasmanie, King George Sound.

Ovata, convexa, nitidula, albido-flavescens; pronoto parcius, subinæqualiter et tenue punctato, ad latera late non profunde

impresso, fortiter punctato subrugoso; elytris moderate punctato-striatis, seriebus primis ad suturam subtilioribus, subregularibus, punctis nigro-fuscis, ad marginem majoribus. Long. 7 mm.

115. **lucidula**, n. sp. Sydney, Victoria.

Oblongiuscula, parum convexa, testacea, nitida; capite subtiliter punctulato, pronoto parce subtiliter punctato, ad latera anguste, parum profunde impresso, punctis majoribus notato; elytris moderate punctato-striatis, interstitiis vix distincte punctulatis, 3, 5 et 9 paulo latioribus pallidioribusque. Long. 5 1/2 mm.

116. **fastidiosa**, n. sp. Sydney, King George Sound, Rockhampton.

Obovata, flavo-testacea; pronoto subtiliter disperse punctato, ad latera oblique impresso et profunde subdense punctato; elytris versus apicem subdilatis, sat profunde punctato-striatis, interstitiis vix distincte punctulatis; marginis lateralis punctis grossis et sat confertis. Long. 6-7 mm.

117. **cernua**, n. sp. Sydney.

Oblongo-ovalis, convexiuscula, rufo-testacea; capite irregulariter punctato, fusco-trimaculato; pronoto distincte et inæqualiter punctato, punctis fusco-nigris, punctulis minutis intermixtis, ad latera impresso, vix profundius punctato; quinque-maculato, macula minuta ante scutellum, aliis majusculis rotundatis transversim positis; elytris oblongis, testaceis, profunde punctato-striatis, seriebus et interstitiis æqualiter et fusco-punctatis, seriebus valde irregularibus, subflexuosis; corpore subtus fusco-testaceo; pedibus ferrugineis, femoribus fusco-maculatis. Long. 13 mm.

118. **conferta**, n. sp. Adelaïde, Darling River.

Breviter ovalis, testacea; capite irregulariter punctato, fusco flavoque variegato; pronoto inæqualiter fortiter punctato, ad latera depresso et varioloso, testaceo subinfusato, disco lineolis longitudinalibus flavo-aureis ornato; elytris subtiliter punctato-striatis, striarum punctis confertis, irregulariter dispositis, interstitiis punctulatis. Long. 7-8 mm.

119. **chlorotica**. Olivier.

120. **bimaculata**. Olivier.

121. **decolorata**, n. sp. Sydney, Brisbane.

Ovalis, flavescens; pronoto remote punctulato, ad latera subdepresso, densius profundiusque punctato-subrugoso; elytris distincte punctato-striatis, seriebus multipunctatis, punctis nigro-fuscis; interstitiis punctulatis. Long. 7-8 mm.

122. **variicollis**, n. sp. Victoria, Tasmanie.

Obovata, testacea, vel flava; capitis vertice nigro; pronoto fusco-variegato, inæquali, subremote punctato, ad latera depresso, profundius punctato-rugoso; elytris postice subdilatatis, fortiter punctato-striatis, punctis nigro-fuscis, congestis, irregulariter ordinatis; corpore subtus cum pedibus nigro, femorum tibiærumque basi rufo-testacea. Long. 10 mm.

123. **irina**, n. sp. Port Denison.

Oblongo-ovalis, parum convexa, atra; fronte obscure rufo-maculata; pronoto parce et subtiliter punctulato, ad latera punctis nonnullis majoribus impresso; elytris regulariter punctato-striatis, punctis profundis, discretis, versus apicem et latera majoribus, interstitiis subconvexis, parce subtiliterque punctulatis, nigro-submetallicis, viridi vel violaceo-nitentibus. Long. 9 mm.

124. **nigrita**, n. sp. Adelaïde.

Breviter ovata, convexa, atra; pronoto sat dense punctato, punctis inæqualibus, versus marginem anticum et versus latera præcipue ad angulos anticos majoribus et subconfluentibus; elytris moderate punctato-striatis, interstitiis punctulatis. Long. 8 mm.

125. **æneipennis**, n. sp. Rockhampton.

Ovata, convexiuscula, flavo-testacea; vertice viridi-æneo; pronoto parce, subtilissime punctato, ad latera punctis nonnullis majoribus; elytris æneo-viridibus, nitidis, vix distincte punctato-striatis, interstitiis planis punctatis, punctis in utrisque æqualibus, sparsis, oblongiusculis. Long. 4 mm.

126. **discoïdalis**, n. sp. Queensland.

Subrotundata, minima, rufo-testacea; capite parcius punctulato, nitido, dimidia postica parte æneo-viridi; pronoto subtiliter et parce punctato, absque punctis lateralibus, obscure brunneo cum nitore viridi-æneo; elytris tenue punctato-striatis, interstitiis vix distincte punctulatis, æneo-viridibus cum macula rotundata rufescenti ante medium; corpore subtus rufo-testaceo, pedibus ferrugineis, femoribus æneo-viridi nitore indutis. Long. 2 mm.

127. **partita**, n. sp. Australie.

Ovata, convexa, nigra; pronoto sat dense subtiliter punctato, punctis ad latera majusculis et confertis, testaceo, nigro-trimaculato; maculis interdum obsoletis; elytris moderate punctato-striatis, nigris, fascia ante medium flava, lata, interrupta, vitta marginali concolore cum angulo suturali connexa; corpore subtus cum pedibus fusco-nigro, tibiærum apice et tarsis ferrugineis. Long. 5 mm.

128. **tritœniata**. Stål.129. **festiva**, n. sp. Victoria.

Ovalis, convexa, nigra; pronoto rufescente, subtiliter et parce punctato, versus latera punctis confertis et majoribus; elytris moderate punctato-striatis, rufescentibus, plaga suturali basi dilatata et ante apicem abbreviata nigra lineolaque concolore in utroque latere, in medio emarginata, cum opposita et cum plaga suturali ante apicem conjuncta; corpore subtus nigro, abdominis margine rufescente, pedibus nigris tibiis extus tarsisque flavescentibus. Long. 4 mm.

130. **pallida**. Olivier.131. **rufescens**, n. sp. Sydney.

Breviter ovalis, convexa, testacea cum capite et pronoto rufescentibus; pronoto densius punctato, punctis versus latera majoribus et confertis; elytris posterius subampliat, distincte punctato-striatis, interstitiis sat dense punctulatis, humeris punctisque striarum et marginis livide fuscis. Long. 8 mm.

132. **tenella**, n. sp. Australie.

Subrotundata, rufo-testacea; capite tenue punctulato; pronoto parce tenuissime punctato, ad latera punctis nonnullis majoribus; elytris tenue punctato-striatis, interstitiis densius et omnium subtilissime punctulatis, ad latera punctis vix majoribus. Long. 7 mm.

133. **mitis**, n. sp. Australie.

Subrotundata, flavo-alba; vertice rufescente; pronoto subtiliter sat dense punctulato, versus latera punctis majusculis, confertis; elytris moderate punctato-striatis, punctis subfuscis, interstitiis parce punctulatis; marginis lateralis externa parte fortiter punctata; tarsis subferrugineis. Long. 4 1/2 mm.

134. **virens**, n. sp. Victoria.

Breviter ovalis, flavo-viridis; pronoto parce subtiliterque punctato, punctis versus latera majoribus, sparsis, non confertis; elytris mediocriter punctato-striatis, punctis subinfuscatis; interstitiis densissime punctulatis; marginis lateralis parte externa fortiter punctata et serie subregulari ab interna separata. Long. 5 1/2 mm.

135. **modesta**, n. sp. King George Sound.

Elliptica, subconvexa, flava, marginibus pronoti et elytrorum angustissime fuscis; pronoto parce et subtiliter punctulato, punctis versus latera majoribus, confertis, subconfluentibus; elytris moderate punctato-striatis, punctis fuscis, discretis, interstitiis parce, subuniseriatim punctulatis; sutura fusco-nigra. Long. 3 mm.

136. **viridula**, n. sp. Sydney.

Oblonga, subconvexa, flavo-viridis; pronoto sublævi, versus latera punctato, punctis præcipue ad angulos anticos confertis; elytris versus apicem subattenuatis, punctato-striatis, punctis partim infuscatis, interstitiis vix distincte punctulatis; pedibus viridibus. Long. 2 1/2 mm.

137. **subænescens**, n. sp. Nouvelle Galles du Sud.

Breviter ovata, convexa, testacea, nitore æneo induta; pronoto parce subtilissime punctulato, punctis versus latera nonnullis majoribus inæqualibus; elytris distincte punctato-striatis, interstitiis parcius vage punctulatis. Long. 4 1/2 mm.

138. **æmula**, n. sp. Australie.

Ovalis, subconvexa, testacea; fronte punctato, medio lævi et infuscato; pronoto punctulato, punctis versus latera majoribus, subconfertis, non confluentibus; elytris mediocriter punctato-striatis, punctis pro magna parte fuscis; interstitiis sat dense punctulatis rugulisque transversis sat dense impressis. Long. 4 mm.

139. **substriata**, n. sp. Australie.

Ovalis, testacea; capite sat dense punctato, vertice rufo-fusco; pronoto densius punctulato, versus latera punctis paulo majoribus et subconfertis, margine antico infuscato; elytris testaceo-viridibus, profunde punctato-striatis, punctis fuscis, interstitiis dense punctulatis. Long. 5 mm.

140. **interrupta**, n. sp. Nouvelle Galles du Sud.

Subrotundata, testacea; pronoto parce punctulato, punctis versus latera majoribus, confertis, linea longitudinali media castanea, interdum obsoleta; scutello fusco-limbato; elytris punctato-striatis, testaceis, interstitiis, 2, 4, 6, 8 castaneis, interstitiis, 3, 5, 9 pallide flavis, sublatisioribus. Long. 3 mm.

141. **jucunda**, n. sp. Swan river, King George Sound.

Breviter ovalis, testacea; capite nigro; pronoto parce subtiliter punctato, punctis versus latera paulo majoribus, vix confertis; scutello nigro; elytris fortiter punctato-striatis, interstitiis biserialiter punctatis, testaceis cum signaturis nigris; maculis duabus suturalibus, tertia humerali, quarta discoïdali, quinta elongata, arcuata, laterali, ante apicem; corpore subtus testaceo cum parapleuris, vitta utrinque abdominali, femoribusque nigris. Long. 4 1/2 mm.

142. **venustula**, n. sp. Australie.

Ovata, subconvexa; capite rufo-fusco, punctulato; pronoto punctato et versus latera punctis majoribus, sat confertis, rufo-fusco,

basi ante scutellum flavescente; elytris distincte punctato-striatis, flavo-testaceis, interstitiis imparibus fusco-brunneis, flavo-notatis; corpore subtus nigro, pedibus ferrugineis. Long. 3 mm.

143. **amabilis**, n. sp. Queensland.

Rotundata, flavo-fusca; capite grosse punctato, testaceo; pronoto flavo, pallide fusco-variegato, subtiliter punctato, punctis versus latera profundis, subconfertis; elytris punctato-striatis, punctis fuscis, impressis, interstitiis punctatis, fasciis duabus ornatis, altera subbasali utrinque interrupta, altera pone medium irregulari. Long. 3 mm.

144. **fuscitarsis**, n. sp. Australie.

Ovata, pallide testacea; pronoto parcius subtiliter punctato, versus latera punctis nonnullis majoribus; elytris distincte punctato-striatis, punctis subfuscis, interstitiis sat fortiter punctatis, 2, 4, 6, 8 vittulis nigro-fuscis a medio ductis et ante apicem abbreviatis ornatis; corpore subtus cum pedibus testaceo, tarsis fuscis. Long. 5 mm.

145. **amœnula**, n. sp. Australie.

Breviter ovata, flava; capite rufescente, vertice nigro; pronoto subtiliter punctulato, punctis versus latera majoribus et confertis; elytris mediocriter punctato-striatis, punctis fuscis, interstitiis subbiseriatim punctulatis, flavis et plaga magna discoïdali communi nigro et rubro-picta ornatis. Long. 3 mm.

146. **stillatipennis**, n. sp. Australie.

Breviter ovata, valde convexa, testacea; capite macula frontali fusca ornato; pronoto sat dense subtiliter punctulato, versus latera punctis indistincte majoribus; elytris flavis, subglobosis, undique sat dense punctulatis, regulariter punctato-striatis, punctis inæquidistantibus, nigris, maculariformibus. Long. 5 1/2 mm.

147. **obliterata**, Er.

148. **subfasciata**, n. sp. Adélaïde.

Ovata, testacea; pronoto subtiliter et parce punctato, punctis versus latera majoribus, subconfertis, testaceo cum angulis anticis et margine antico late pallide flavis; elytris flavis, profunde punctato-striatis, punctis confertis, nigro-fuscis, fasciis macularibus nigris duabus ornatis, altera in medio, altera pone medium. Long. 5 mm.

149. **fuscula**, n. sp. Australie.

Ovata, convexuscula, obscure testacea; pronoto sat dense et fortiter punctato, versus latera punctis profundis nonnullis; elytris

profunde punctato-striatis, punctis confertis, fusco-confluentibus, interstitiis sat dense punctulatis; maculis quinque diffusis fuscis notatis, una communi, duabus utrinque versus apicem, altera in 4°, altera in 8° interstitio. Long. 5 mm.

150. **defecta**, n. sp. Australie.

Ovata, pallide flava; capite punctato, vertice nigro; pronoto parce et subtiliter punctulato, punctis ad latera majoribus; elytris profunde punctato-striatis, punctis fuscis et maculis concoloribus nonnullis oblongiusculis ornatis. Long. 5 mm.

151. **subapicalis**, n. sp. Australie.

Ovata, convexa, pallide flava, nitida; capite nitido, punctulato, nigro, medio flavescente; pronoto tenue et parce punctulato, ad latera punctis nonnullis majoribus; elytris subtiliter punctato-striatis; interstitiis tenuissime subuniseriatim punctulatis, macula rotundata nigra ante apicem in utroque elytro; corpore subtus flavo, metasterno abdomineque utrinque nigro-vittato. Long. 4 mm.

152. **coadnuta**, n. sp. Sydney.

Ovata, convexiuscula, nitida, testacea; pronoto subtilissime et densius punctato, ad latera punctis majoribus sat confertis; elytris profunde punctato-striatis, seriebus subflexuosis, basi et apice vario modo conjunctis, punctis fuscis, interstitiis parce punctulatis, 1° pone medium, 6° in medio, 8° basi et apice infuscatis. Long. 5 1/2 mm.

153. **fraterna**, n. sp. Australie.

Ovalis, paulisper convexa, nitida, flavo-testacea; capite fortiter punctato, rufescente, vertice nigro; pronoto tenue parce punctulato, ad latera punctis majoribus confertis; elytris profunde punctato-striatis; interstitiis subuniseriatim punctatis; striarum et interstitiorum punctis æqualibus; sutura nigra, medio et apice rufo-vittata, in utroque elytro vittula discoïdali nigra, medio valde interrupta; corpore subtus flavescente, suturis obscuris. Long. 4 1/2 mm.

154. **lepida**. Erichson.

155. **trifasciata**. Boisduval.

156. **mediovittata**. Clark.

157. **suturalis**. Germar.

158. **scutellata**, n. sp. Sydney. Nouvelle Galles du Sud.

Oblongo-ovalis, convexiuscula, pallide testacea; capitis vertice rufescente; pronoto parcius subtiliusque punctato, ad latera punctis

majoribus nonnullis; scutello longitudine paulisper latiori, subsemicirculari; elytris profunde punctato-seriatis, punctis fuscis et ante apicem profundioribus et magis infuscatis. Long. 7 mm.

159. **Hera**. Stål.

160. **turbata**, n. sp. Champion Bay.

Subelongata, depressa, flavo-testacea; vertice nigro; pronoto irregulariter tenue punctato, ad latera punctis paulo majoribus, confertis; elytris moderate punctato-striatis; punctis confertis, fuscis, seriebus 8, 9, 10 turbatis, interstitiis punctulatis; sutura anguste fusco-nigra, macula humerali concolore diffusa, plus minusve versus apicem abducta. Long. 7 1/2 mm.

161. **scaphula**, n. sp. Sydney. Nouvelle Galles du Sud.

Oblongo-ovalis, depressa, testacea; capite punctato, infuscato; pronoto dense subtiliter punctulato, punctis ad latera majoribus, confertis, confluentibus, linea longitudinali fusco-nigra; elytris profunde punctato-striatis, punctis fuscis, sutura fusco-nigra, interstitiis punctulatis, 3 latiusculo, 4 et 6 apice connexis, leviter infuscatis; corpore subtus medio plus minusve late infuscato. Long. 7. mm.

162. **navicula**, n. sp. Australie.

Oblongo-ovalis, subdepressa, flava; capite irregulariter punctato, rufescente; pronoto parce subtilissime punctato, ad latera punctis majoribus sat confertis; elytris punctato-striatis, punctis pone medium impressis, interstitiis vix distincte punctatis, versus apicem subconvexis; in utroque elytro maculis duabus fuscis, diffusis, altera subbasali, altera ante apicem. Long. 3 1/2 mm.

163. **Hamadryas**. Stål.

164. **depressa**, n. sp. Queensland.

Ovata, lata, depressa, rufo-brunnea, pronoto parcius subtiliusque punctato ad latera punctis majoribus, impressis; elytris regulariter profunde punctato-striatis, punctis fuscis, interstitiis minute punctulatis, macula discoïdali ante medium nigra. Long. 6 mm.

QUATRIÈME GROUPE.

Les dix séries de points qui caractérisent le troisième groupe, sont dédoublées dans le groupe actuel.

Dans une bonne partie des espèces, on constate aisément la présence de vingt séries de points, parce que celles-ci sont plus ou moins régulièrement gemellées. Dans d'autres, chez lesquelles les séries sont bien distinctes, quoique non gemellées, il est encore

facile de les reconnaître et de les compter. Mais chez un grand nombre, il faut des recherches attentives; il arrive même que les séries sont assez rapprochées et assez irrégulières pour faire paraître la ponctuation confuse. Cependant, avec un peu d'habitude, les cas où le doute serait permis sont, en réalité, peu nombreux.

Ce groupe renferme deux types bien marqués; dans l'un, les séries de points sont plus ou moins régulièrement gemellées, la taille est petite, la coloration généralement vive, à dessins bien tranchés, le pronotum ne présente aucune trace de dépression vers les bords latéraux.

Dans l'autre type, les séries de points ne sont pas gemellées ou ne le sont que d'une manière indistincte; le pronotum offre de chaque côté une impression appréciable; presque toujours la coloration est d'un brun rougeâtre ou noirâtre; les élytres sont ornées de saillies variées, de granulations, de papules, de tubercules, de côtes interrompues ou de rugosités transversales.

165. **M-fuscum**. Boheman.

166. **Lachesis**. Stål.

167. **basicollis**, n. sp. Sydney, Clarence River.

Breviter ovata, flavo-rufescente; capite punctato, utrinque late nigro; pronoto sat dense subtiliter punctato, ad latera punctis nonnullis majoribus, utrinque basi plaga transversa ornato; elytris subtiliter punctato-striatis, sutura, margine apicali et in utroque maculis 6 magnis nigris; femorum apice nigro-maculato. Long. 4 1/2 mm.

168. **spectabilis**, n. sp. Parao River.

Breviter ovata, convexa, flavo-rufescente, capite nigro, medio rubro; pronoto densius sat fortiter punctato, ad latera punctis majoribus, disco utrinque macula parva transversa nigra notato; scutello rufescente; elytris moderate punctato-striatis; punctis, sutura et signaturis nigris; in utroque elytro maculis duabus basilibus, una posthumerali, fascia in medio, et maculis duabus ante apicem; abdomine medio nigro-fusco. Long. 4 1/2 mm.

169. **rubiginosa**, n. sp. Adélaïde.

Breviter ovata, flava; capite vertice subrufescente; pronoto subtiliter et dense, ad latera grosse punctato; elytris profunde punctato-striatis, punctis fusco-nigris, maculis duabus basi, duabus ante medium et plaga magna subapicali rubiginosis; interstitiis versus apicem convexis; mesosterno utrinque nigro-plagiato. Long. 5 mm.

170. suturella, n. sp. Australie.

Elliptica, testacea; capitis vertice nigro-bimaculato; pronoto subtilissime punctato, ad latera punctis majoribus, inaequalibus; scutello nigro-limbato; elytris moderate punctato-striatis, punctis fuscis; interstitiis punctulatis, puncto humerali et sutura paulo pone medium abbreviata, nigris; corpore subtus testaceo, utrinque fusco-maculato. Long. 4 1/2 mm.

171. tetraspilota, n. sp. Adélaïde. Melbourne.

Breviter ovata, nigra; pronoto parcius subtiliterque punctato, ad latera punctis confertis et majusculis; elytris moderate punctato-striatis, in utroque maculis duabus magnis ferrugineis, altera basali, altera pone medium; antennis tarsisque ferrugineis. Long. 5 mm.

172. picturata, n. sp. Sydney. Clarence River.

Breviter ovata, nigra; pronoto parce et subtiliter punctato, ad latera punctis majoribus sat densis, rufo-ferrugineo, plaga maxima in medio et utrinque plaga subrotundata nigris; elytris moderate punctato-striatis, in medio disci fascia transversa, utrinque abbreviata rufo-ferruginea; antennis, palpis tarsisque fusco-ferrugineis. Long. 4 1/2 mm.

173. nigropicta. Clark.**174. dimidiata**, n. sp. Sydney.

Breviter ovata, convexa, rufo-ferruginea; capite utrinque late nigro; pronoto parce punctulato, ad latera punctis majoribus et sat densis, utrinque plaga basali transversa nigra; elytris distincte punctato-striatis, nigris, basi late maculaque subapicali ferrugineis. Long. 4 mm.

175. pulchella, n. sp. Australie.

Breviter ovata, nigra; capitis rufi vertice nigro; pronoto parce sat fortiter punctato, ad latera punctis majoribus nonnullis, rufo-ferrugineo cum maculis quatuor transversim positis, maculaque in medio-marginis antici nigris; elytris moderate punctato-striatis, rufo-ferrugineis, vittulis nigris, latis, altera suturali et utrinque altera discoïdali nigris; corpore subtus nigro, pedibus ferrugineis, femorum dimidia externa parte nigra. Long. 4 1/2 mm.

176. pallidula, n. sp. Adélaïde.

Breviter ovata, flava; capitis vertice subrufescente; pronoto subtiliter et dense, ad latera grosse punctato; elytris profunde punctato-striatis, punctis fusco-nigris, seriebus subregulariter geminatis, interstitiis versus apicem convexis. Long. 5 mm.

177. **livida**, n. sp. Adélaïde.

Breviter ovata; capitis vertice fusco-nigro; pronoto parce et distincte punctato, ad latera punctis nonnullis majoribus et fuscis, obscure flavescenti, fusco-variegato; scutello flavo; elytris fusco-lividis, distincte punctato-seriatis, punctis fusco-nigris; subtus capite, prosterno et mesosterno albido-flavis; metasterno abdomineque flavo-fuscatis, femoribus albido-flavis, tibiis et tarsis infuscatis. Long. 4 1/2 mm.

178. **tigrina**, n. sp. Sydney.

Breviter ovata, convexa, testacea; pronoto subtiliter parcellissime punctulato, ad latera punctis raris majoribus, testaceo flavo-variegato; scutello fusco; elytris sat profunde punctato-striatis, testaceis, fusco et nigro-variegatis. Long. 5 mm.

179. **ioptera**. Baly.180. **multiseriata**, n. sp. Sydney.

Ovata, convexa, testacea; capite dense punctato, rufo-testaceo, vertice nigro; pronoto sat dense et fortiter punctato, ad latera subdepresso et punctato-subrugoso, rufo-testaceo cum maculis quatuor transversim positis nigris; scutello nigro-fusco; elytris sat profunde punctato-striatis, punctis fuscis, interstitiis punctulatis, testaceis, undique subirregulariter fusco-maculatis; corpore subtus nigro-fusco, pedibus ferrugineis. Long. 7-8 mm.

181. **obscura**, n. sp. Parao River.

Obovata, convexa, rufo-castanea; pronoto dense et fortiter punctato, ad latera subimpresso, rugoso-punctato; elytris postice subdilatatis, profunde punctato-striatis, punctis fuscis, interstitiis punctatis, aliis fortiter et dense, aliis pallidioribus rufo-ferrugineis, subtilius punctulatis; corpore subtus cum pedibus piceo. Long. 8 mm.

182. **arcula**, n. sp. Australie.

Ovata, convexa, rufo-castanea, capite dense rugoso-punctato, antice nigricante; pronoto densius fortiter punctato, ad latera depresso et rugoso-punctato, rufo-castaneo obscurius limbo; elytris fortiter et dense punctato-striatis, transversim subrugulosis, macula communi sat magna nigra ante medium, interstitiis punctatis, nonnullis subelevatis. Long. 9 mm.

183. **orbicularis**, n. sp. Sydney. Nouvelle Galles du Sud.

Subrotundata, rufo-castanea; capite dense punctulato, vertice nigro-maculato, pronoto fortiter parce punctato, ad latera distincte depresso et fortiter punctato-rugoso; maculis quatuor nigris transversim positis; elytris profunde punctato-striatis; interstitiis

quinque angustis rufo-castaneis, fusco subinterruptis; interstitiis quatuor latoribus nigro-fuscis, maculis rufescentibus notatis; corpore subtus fusco-piceo, pedibus ferrugineis. Long. 7 mm.

184. **sublineata**. Boheman.

185. **diffusa**, n. sp. Australie.

Subrotundata, convexa, rufo-castanea; pronoto parce subtiliter punctato, ad latera vage impresso, punctis majoribus confertis, disco utrinque maculis duabus nigris ornato; altera parva rotundata, altera longitudinali oblonga; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis vix distincte punctulatis, sutura, humeris maculisque diffusis piceo-nigris; pedibus ferrugineis. Long. 6 mm.

186. **papuligera**. Stål.

187. **papulenta**. Chp. (*papulosa* Stål.)

188. **scabra**, n. sp. Australie.

Oblonga, utrinque obtusa, subconvexa, obscure rufo-castanea; capite rugoso-punctato, vertice nigricante; pronoto profunde variegato-punctato, utrinque oblique bi-impresso, ad latera rugoso-punctato; elytris profunde punctato-striatis, interspatiis striolatis, interstitiis subcostatis, tertio elatiore; rufo-castaneis nigro-variegatis, impressione discoïdali sat profunda, subquadrata, nigra; corpore subtus rufo-piceo. Long. 7 mm.

189. **impressa**, n. sp. Sydney.

Subrotundata, rufo-castanea; pronoto parce et subtiliter punctato, ad latera profunde impresso, subrugulose punctato; elytris profunde punctato-striatis, humeris elevato-gibbosis, punctatis, interstitiis valde irregulariter elevatis, basi longitudinaliter subcarinatis, in medio transverse elevato-rugosis, versus apicem tuberculatis; impressione discoïdali parum profunda. Long. 8 mm.

190. **rugosa**, n. sp. Gipsland, Victoria.

Subrotundata, convexa, flavo-subaurantiaca; vertice nigro-bimaculato; pronoto inæquali, parcius punctato, ad latera profunde impresso grosse rugoso-punctato; maculis 3 vel 5 diffusis, nigris; scutello fusco; elytris profunde et irregulariter punctato-striatis, punctis fuscis, hinc et inde nigro-variegatis, tuberculis obtusis vel papulis undique obsitis; depressione discoïdali parva. Long. 8 mm.

191. **aspera**, n. sp. Sydney. Port Denison.

Oblonga, convexuscula, rufo-testacea; pronoto parce et fortiter punctato, ad latera depresso, punctato-rugoso, lateribus paulisper dilatatis ante apicem subemarginatis, angulis acutis, extrorsum mucronatis; elytris profunde punctato-striatis, interstitiis dense et

fortiter granulato-tuberculatis, alternantibus, aliis magis, aliis moderate tuberculatis; rufo-testaceis, basi apice et in medio extus nigricantibus. Long. 9 mm.

192. **rugulosa**. Boisduval.

193. **ferrugata**, n. sp. Tasmanie.

Oblongo-ovalis, rufo-castanea; capite dense punctato-rugoso, vertice medio et utrinque nigro-maculato; pronoto subinæquali, dense fortiter punctato, ad latera rugoso, vix depresso; elytris profunde parum regulariter punctato-striatis, interstitiis subelevatis, 3 elatiore, versus apicem et latera subtuberculatis; corpore subtus testaceo et fusco-variegato. Long. 9-10 mm.

194. **caliginosa**, n. sp. Port Denison, Nouvelle Galles du Sud.

Ovata, rufo-castanea et picea; pronoto parce inæqualiter punctato, ad latera punctis majoribus, late depresso et tuberculo obtuso notato, rufo-castaneo cum tuberculo et macula utrinque diffusa nigro-piceis; elytris profunde punctato-striatis, rufo-castaneis, piceo-indutis, interstitiis convexis, tuberculatis, tuberculis inæqualibus, rotundatis vel oblongis, corpore subtus nigro-piceo. Long. 8 mm.

195. **piceola**, n. sp. Australie.

Ovata, convexa, rufo-castanea, piceo tincta; pronoto æquali, sat dense et fortiter punctato, ad latera depressiusculo, rugoso-punctato et subtuberculato; rufo-piceo, versus latera rufescente; elytris piceo-nigris, rufo-castaneo-limbatis et variegatis, profunde punctato-striatis, interstitiis novem sublatis, versus apicem tuberculatis; corpore subtus rufo-piceo, pedibus ferrugineis cum femoribus quatuor posticis obscuris. Long. 9 mm.

196. **melanospila**, n. sp. Gippsland, Sydney.

Ovata, convexa, nigro-picea; capite rugoso-punctato, vertice medio et fronte antica nigricante; pronoto fortiter sat dense punctato, ad latera depresso, rugoso-punctato, obtuse tuberculato, rufo piceoque variegato; scutello subrugoso; elytris flavo-ferrugineis, piceo-maculatis, profunde punctato-striatis, punctis piceis, tuberculis concoloribus obtusis vel papulis seriebus novem plus minusve distinctis dispositis. Long. 9 mm.

197. **seriata**, Germar.

198. **coriaria**, n. sp. Melbourne.

Ovata, lata, fusco-picea, capite punctato-rugoso; pronoto dense et fortiter punctato, subrugoso, ad latera impresso, profundius punctato-rugoso, tuberculo obtuso notato; linea media longitudinali lævi, subelevata, utrinque abbreviata; elytris rufo-fuscis, piceo-

variegatis, profunde punctato-striatis, interstitiis omnibus subæqualibus, alternis versus apicem tuberculatis vel nodulosis. Long. 10 mm.

199. **convexicollis**, n. sp. Parao River.

Late ovata, obscure brunnea; capite dense punctato, linea media longitudinali sublævi, vertice et fronte antica nigricantibus; pronoto convexo, dense fortiter et regulariter punctato, linea media longitudinali obsolete elevata, versus latera vix perspicue impresso, fortiter punctato-rugoso; scutello punctato; elytris obscure brunneis; tuberculis nonnullis fusco-piceis; profunde punctato-seriatis, punctis paulo minoribus undique sparsis, interstitiis novem sublaticioribus, leviter convexis, plus minusve regulariter tuberculatis. Long. 10 1/2 mm.

200. **litigiosa**, n. sp. Port Denison.

Ovata, convexa, rufo-brunnea; capite irregulariter punctato, vertice obscuro; pronoto longiori, parcius inæqualiter punctato, punctis minutis intermixtis, ad latera obsolete depresso, punctis majoribus confertis, marginibus et disco utrinque piceis; scutello lævi; elytris profunde punctato-seriatis, interstitiis novem rufo-brunneis, versus apicem sat fortiter tuberculatis, 3 et 5 paulo laticioribus. Long. 10 mm.

201. **exarata**, n. sp. Rockhampton, King George Sound.

Late ovata, convexa, flavo vel rufo-brunnea; capite dense punctato, longitudinaliter rugoso; pronoto parcius grosse punctato, interspatiis striolatis et punctulatis, ad latera depresso, punctis majoribus confertis; scutello punctulato; elytris fortiter punctato-striatis, interspatiis punctulatis; testaceis et maculis in utroque quatuor nigris, interstitiis novem sublaticioribus, paulo pone basin tuberculatis. Long. 9 mm.

202. **catenata**, n. sp. Sydney, Melbourne, Nouvelle Galles du Sud.

Breviter ovata, rufo-brunnea; capite punctulato, macula media nigra, subtrigona; pronoto parce subtiliter punctato, ad latera impresso et punctis majoribus confertis, disco utrinque vitta nigra longitudinali a basi ad apicem extensa; elytris moderate punctato-striatis, interspatiis subtilissime punctulatis; interstitiis novem obtuse tuberculatis, vitta laterali maculisque tribus nigris notatis. Long. 8 mm.

203. **infuscata**, n. sp. Australie.

Subrotundata, læte ferruginea; pronoto parcius et irregulariter punctato, interspatiis punctulatis, ad latera punctis latis, parum profundis, confertis, vix depresso et tuberculo obtuso, lato, macu-

lisque duabus nigris ornato; elytris brunneis, opacis, moderate punctato-striatis, undique omnium subtilissime punctato-granulatis, interstitiis alternis minute tuberculatis et vittulis quatuor nigris plus minusve distinctis. Long. 8 mm.

204. **fusco-notata**, n. sp. King George Sound.

Oblongo-ovata, convexa, rufo-brunnea; pronoto sat dense subtiliter punctato ad latera punctis nonnullis majoribus, depresso et tuberculo obtuso, nigro, ornato; scutello punctulato; elytris moderate punctato-striatis, sutura et tuberculis vel verrucis longitudinaliter subordinatis nigris. Long. 5 1/2 mm.

205. **serpiginosa**, Erichson.

206. **explanata**, n. sp. Rivière des Cygnes.

Oblongo-ovata, subconvexa, nigro-picea; pronoto sat dense et fortiter punctato, ad latera late depresso, varioloso-punctato; elytris profunde punctato-striatis, postice dilatatis, interspatiis æque et dense punctatis; interstitiis nonnullis subelevatis, abbreviatis, versus apicem nodulosi, vel tuberculatis; in disco transverse rugulosis, margine laterali valde dilatato, subreflexo. Long. 15 mm.

207. **papulosa**. Erichson.

208. **sublimbata**, n. sp. Adelaïde.

Late ovata, convexa, nitida, rufo-brunnea, pronoto parce et subtiliter punctato, medio longitudinaliter obsolete carinato, ad latera profunde et late depresso, rugoso-punctato, macula utrinque magna irregulari nigra; scutello subruguloso, medio subcarinato; elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis omnibus tuberculatis; tuberculis valde inæqualibus nonnullis versus apicem subinfuscatis; sutura et vitta laterali, inter discum et marginem, nigris; corpore subtus cum pedibus ferrugineo. Long. 11 mm.

209. **punctata**. Marsh.

210. **tuberculata**, n. sp. Nouvelle Galles du Sud, Port Denison, Adelaïde, Sydney.

Late ovata, convexa, subnitida, rufo-brunnea; pronoto parcius subtiliter punctato, punctis minutis intermixtis, ad latera late et profunde depresso, punctis majoribus confertis; scutello subpunctato; elytris subtiliter punctato-striatis, interspatiis sparsim punctulatis, interstitiis novem fere a basi ad apicem obtuse tuberculatis. Long. 9 mm.

211. **spilota**, n. sp. Australie.

Breviter ovata, convexa, nitida, brunnea; capite dense punctu-

lato, vertice medio nigro; pronoto parce fortiter punctato, ad latera subdepresso et punctis majoribus confluentibus; scutello ruguloso, nigro; elytris moderate punctato-striatis, interspatiis punctatis, interstitiis novem verrucis nigris, inæqualiter obsitis; humeris nigro-maculatis. Long. 8 mm.

212. **incurva**. Clark.

213. **cancellata**, n. sp. Brisbane.

Ovata, convexa, rufo-brunnea; pronoto remote, sat fortiter punctato, punctis minutis intermixtis, ad latera depresso et punctis majoribus subconfertis, plaga media a basi ad apicem nigra; elytris subopacis, punctato-striatis, punctis parvis et raris, interstitiis novem (1^o ad scutellum obsolete) tuberculis vel papulis obsitis, maculis tribus, vitta sublaterali, tuberculisque nigris; corpore subtus cum pedibus ferrugineo. Long. 9 mm.

214. **asperula**, n. sp. Rockhampton.

Ovata, convexa, subnitida, rufo-brunnea; capite ruguloso, parce punctato; pronoto fortiter et remote punctato, punctis minutis dense intermixtis, ad latera depresso et punctis majoribus confertis, plaga media lata a basi ad apicem extensa, nigra; elytris subnitidis, profunde punctato-striatis, interspatiis remote punctulatis, interstitiis novem (1^o ad scutellum obsolete), tuberculis remote obsitis et maculis tribus ornatis; corpore subtus rufo-brunneo. Long. 9 mm.

215. **verrucicollis**, n. sp. Sydney.

Ovata, convexa, rufo-picea; capite dense punctato, fronte rufescente, pronoto parcissime subtiliter punctato, ad latera subdepresso, punctis majoribus confluentibus; obscure rufo, linea media verrucisque quatuor transversim ante medium positae, nigris; scutello convexo, nigro; elytris fortiter punctato-striatis, punctis subremotis, interstitiis irregularibus, inæqualibus, primis basi convexis, versus apicem, ut aliis, tuberculatis, obscure rufescentibus, nigropiceo-variegatis; corpore subtus cum pedibus piceo-nigro. Long. 7 mm.

216. **perparvula**. Clark.

217. **granaria**, n. sp. King George Sound.

Rotundata, convexa, rufo-brunnea; pronoto densius subtiliter punctato, ad latera obsolete depresso, punctato-rugoso, disco utrinque plaga magna ante humerum nigra; scutello sat dense punctato; elytris moderate punctato-striatis, punctis minoribus intermixtis, rufo-brunneis et sutura anguste, macula humerali

tuberculisque minutis sparsis, ordinatis, nigris; corpore subtus nigro-piceo; abdomine partim et pedibus ferrugineis. Long. 6 mm.

218. **nodosa**, n. sp. Sydney, Victoria.

Subrotundata, convexa, rufo-brunnea; pronoto dense subtiliter punctato, punctis minutis numerosis intermixtis, ad latera obsolete depresso, tuberculo obtuso ornato; scutello subcarinato, punctis nonnullis sparsuto; elytris subtiliter coriaceis, profunde punctato-striatis, punctis minutis intermixtis; paulo ante medium subdepressis, depressione et tuberculis nonnullis sparsis nigris; corpore subtus ferrugineo. Long. 5 mm.

219. **scalaris**, n. sp. Victoria, Gipsland.

Subrotundata, rufo-brunnea; pronoto dense et fortiter punctato, punctis minutis intermixtis, ad latera depressione vix perspicua, punctis majoribus confertis et confluentibus, disco utrinque nigro-plagiato; scutello lævi et punctis nonnullis impresso; elytris profunde punctato-striatis, punctis minutis intermixtis, sutura inæqualiter nigra, maculis duabus basi et plagis majusculis vel parvis irregularibus, nigris, notatis; corpore subtus nigro, abdomine et pedibus subferrugineis. Long. 4 1/2 mm.

220. **graphica**, n. sp. Sydney.

Late ovata, nigro-picea, rufo-variegata; capite subrugoso, vertice nigro; pronoto parce sat fortiter punctato, ad latera depresso, rugoso-punctato, maculis quatuor nigris, duabus discoïdalibus, duabus lateralibus parvis notato; scutello lævi; elytris profunde punctato-striatis, punctis minutis intermixtis, rufo-brunneis, lineis longitudinalibus circiter novem nigro-piceis; interstitiis rufo-brunneis, præcipue versus apicem calloso-tuberculatis; corpore subtus nigro-piceo, pedibus rufescentibus. Long. 12 mm.

221. **costipennis**, n. sp. Sydney.

Ovata, convexa, nigro-picea, rufo-variegata; pronoto parce et subtiliter punctato, subtilissime alutaceo, ad latera depresso et grosse punctato, maculis quatuor, subelevatis, transversim positis, ornato; scutello lævi, nigro; elytris dorso subdepressis, profunde punctato-striatis, interstitiis novem interrupte costatis; corpore subtus piceo-nigro. Long. 8 1/2 mm.

222. **corrugata**, n. sp. Sydney.

Breviter ovata, nitida, rufo-brunnea; pronoto dense, tenue, subirregulariter punctato, ad latera depresso, punctato-rugoso, obtuse tuberculato; elytris subtiliter punctato-striatis, dorso obsolete depressis, versus medium distincte transversim rugulosis, interstitiis fere omnibus pone basin et versus apicem granuloso-tuber-

culatis; corpore subtus flavo-ferrugineo, piceo-variegato. Long. 7 mm.

223. **strigosa**, n. sp. Parao Riv.

Ovato-rotundata, rufo-brunnea; capite punctulato, medio nigro-maculato; pronoto subtiliter et densius punctulato, ad latera obsolete depresso cum punctis majoribus confluentibus, utrinque macula magna nigra et tuberculo obtuso notato; elytris profunde punctato-striatis, medio transverse substrigosis; sutura et lineolis quatuor longitudinalibus, angustis, nigris; interstitiis novem, 1 obsolete, tuberculatis; corpore subtus flavo-ferrugineo. Long. 7 mm.

224. **semiglobosa**, n. sp. Adelaïde.

Rotundata, rufo-testacea; pronoto parce subtiliter punctato, ad latera depresso, cum punctis majoribus partim confluentibus et tuberculo obtuso nigro utrinque ornato; scutello punctulato; elytris moderate punctato-striatis et punctis minutis sat numerosis intermixtis, medio leviter parce strigosis, maculis duabus nigris pone basin; altera humerali, altera inter primam et scutellum; versus apicem papulis nonnullis nigro-fuscis; pectore nigro, abdomine et pedibus ferrugineis. Long. 4 mm.

225. **rufo-nigra**, n. sp. Australie.

Subrotundata, convexiuscula, rufo-nigra; capite punctato, rufo, basi apiceque obscuro; pronoto parcius subtiliter punctato, punctulis minutis intermixtis, ad latera subdepresso, cum punctis majoribus et tuberculo obtuso; elytris moderate punctato-striatis, interstitiis nonnullis hinc et inde elevatis, nitidis, versus apicem noduloso-costatis, obscure rufis, piceo-variegatis. Long. 5 mm.

226. **pardalis**, n. sp. Australie.

Ovata, pallide flava; capite punctato, nigro-variegato; pronoto dense et fortiter punctato, punctis minutis intermixtis, ad latera grosse punctato, depresso et obtuse tuberculato, disco utrinque nigro-bimaculato; elytris sat profunde punctato-striatis, interstitiis alternis tuberculis nigris vix elevatis, vel papulis oblongis, a basi ad apicem subirregulariter ornatis. Long. 5 1/2 mm.

227. **tessellata**. Clk.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES ⁽¹⁾.

34. abdominalis.	0. captiosa Clark.
5. aciculata.	20. carnosà Baly.
<i>ægrata</i> Boisd. (17.)	0. cassidoïdes Boisd.
138. æmula.	0. castanea Marsh.
125. æncipennis.	202. catenata.
103. æqualis.	117. cernua.
44. æraria.	<i>Charybdis</i> Stål. (13).
66. agricola.	119. chlorotica Oliv.
109. albicans.	28. Circe Stål.
54. alternata Germar.	64. circumdata Newm.
143. amabilis.	102. citrina.
0. amboinensis Fabr.	65. Cloelia Stål.
0. amica Newm.	78. Clotho Stål.
0. amœna Clk.	152. coadnuta.
145. amœnula.	0. coccinelloïdes Oliv.
96. anxia.	62. complexa.
0. apicata Clk.	118. conferta.
183. arcula.	69. conjugata.
191. aspera.	18. consimilis Baly.
214. asperula.	33. contracta.
180. assimilis.	199. convexicollis.
0. atomaria Oliv.	198. coriaria.
13. atomaria Marsh.	222. corrugata.
<i>Atropos</i> Stål (29).	221. costipennis.
0. australasiæ Fabr.	10. crocata Boisd.
75. basalis.	114. debilis.
167. basicollis.	121. decolorata.
56. beata Newm.	150. defecta.
120. bimaculata Oliv.	104. deflorata.
<i>biplagiata</i> Bohem (29).	98. delicatula.
31. bipuncticollis.	164. depressa.
79. brunnea Marsh.	185. diffusa.
194. caliginosa.	9. dilatata Erichs.
213. cancellata.	174. dimidiata.

(1) Les chiffres indiquent, non la page, mais le numéro d'ordre des espèces. Les noms en caractères italiques sont des synonymes. Les noms accompagnés du signe 0 indiquent les espèces qui me font défaut et que je désirerais obtenir par échange.

126. discoidalis.
 105. elliptica.
 83. erudita Newm.
 201. exarata.
 206. explanata.
 52. fallax Newm.
 116. fastidiosa.
 193. ferrugata.
 129. festiva.
 108. flaveola.
 67. flavitarsis.
 45. foraminosa.
 27. formosa.
 153. fraterna.
 11. fulvoguttata Baly.
 144. fuscitarsis.
 204. fusconotata.
 149. fuscula.
 73. gemina.
 0. geniculata Boisd.
 16. geographica Baly.
 36. globata.
 39. globulosa.
 217. granaria.
 220. graphica.
 163. Hamadryas Stål.
 44. hastata.
 101. hectica Boisd.
 38. hemisphærica.
 159. Hera Stål.
 immaculata Marsh (29).
 189. impressa.
 incarnata Erichs. (8).
 112. incerta.
 212. incurva Clark.
 203. infuscata.
 86. inspersa Newm.
 70. intacta Newm.
 0. interlita Newm.
 140. interrupta.
 110. interstitialis.
 93. interstincta Clark.
 179. ioptera Baly.
 123. irina.
 51. Iris.
 81. irrisa Newm.
 26. irrotata.
 144. jucunda.
 166. Lachesis Stål.
 0. læsa Germ.
 154. lepida Erichs.
 0. lignea Erichs.
 55. lineata Marsh.
 200. litigiosa.
 82. liturata Marsh.
 177. livida.
 0. Lownei Baly.
 115. lucidula.
 17. lutea Marsh.
 15. maculata Marsh.
 106. maculicollis Clark.
 14. marmorea Oliv.
 156. mediovittata Clark.
 165. M-fuscum Boh.
 196. melanospila.
 60. mera.
 0. metallica Mots.
 0. miliaris Boisd.
 84. minor Marsh.
 133. mitis.
 135. modesta.
 0. morbillosa Boisd.
 47. morio Fabr.
 181. multiseriata.
 162. navicula.
 0. nervosa Clark.
 48. nigerrima Germar.
 0. nigripicta Baly.
 124. nigrila.
 0. nigrilula Clark.
 95. nigroconspersa Clark.
 173. nigropicta Clark.
 6. nigroscutata.
 90. nigrostillata.
 74. nigrovittata.
 0. nobilitata Erichs.
 218. nodosa.
 0. notata Oliv.
 92. notatipennis.
 80. nucca Erichs.
 0. oblitterata Erichs.
 43. oblonga.
 99. obovata.
 182. obscurella.

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 22. obsoleta Oliv. | 21. roseola Baly. |
| 0. octolineata Gory. | 37. rubeola. |
| 85. octomaculata Marsh. | 169. rubiginosa. |
| 59. octosignata Stål. | 57. rubrosignata Boh. |
| 184. orbicularis. | 131. rufescens. |
| 25. ornata Marsh. | 63. rufipes Fabr. |
| 68. ornatcollis. | 225. rufo-nigra. |
| 0. orphana Erichs. | 12. rufitarsis. |
| 97. orphanula ⁽¹⁾ . | 190. rugosa. |
| 107. pachyta. | 192. rugulosa Boisd. |
| 130. pallida Oliv. | 0. sanguineotincta Clark. |
| 176. pallidula. | <i>sanguinipennis</i> Germ. (8). |
| 0. pantherina Fauvel. | 188. scabra. |
| 24. Paphia Stål. | 219. scalaris. |
| 187. papulenta Chp. | 161. scaphula. |
| 186. papuligera Stål. | 158. scutellata. |
| 207. papulosa Erichs. | 224. semiglobosa. |
| <i>papulosa</i> Stål (187). | 40. semipunctata. |
| 226. pardalis. | 197. seriata Germ. |
| 0. Parryi Baly. | 205. serpiginosa Erichs. |
| 127. partita. | 58. sexpustulata Marsh. |
| 35. pedestris. | 0. signata Boisd. |
| 216. perparvula Clark. | 147. sparsuta. |
| 46. perplexa. | 168. spectabilis. |
| 29. picea Oliv. | 211. spilota. |
| 195. piceola. | 0. splendens Mac-Leay. |
| 61. picta. | 30. Ståli. |
| <i>pictipennis</i> Boh. (84). | 89. stictica Marsh. |
| 7. pictipes. | 146. stillatipennis. |
| 172. picturata. | 223. strigosa. |
| 88. pluvialis. | 50. stygia. |
| <i>polyglypta</i> Germ. (70). | 137. subaenescens. |
| 23. porosa Erichs. | 151. subapicalis. |
| 19. propinqua Baly. | 71. subcostata. |
| 111. proxima. | 148. subfasciata. |
| 175. pulchella. | 208. sublimbata. |
| 209. punctata. | 184. sublineata Boh. |
| 0. punctulata Boisd. | 42. subovalis. |
| 0. purpureoaurora Clark. | 139. substriata. |
| 0. purpureoviridis Clark. | 0. suspiciosa Baly. |
| 0. 4-maculata Marsh. | 157. suturalis Germ. |
| 0. 5-maculata Baly. | 170. suturella. |
| 87. remota Germ. | 0. sydneyensis Fauvel. |
| 8. reticulata Marsh. | 2. tasmanica Baly. |

(¹) Par suite de la comparaison des types, cette espèce est identique à *P. orphana* d'Erichson (Auct.).

132. tenella.	0. ustulata Oliv.
227. tessellata Clark.	76. variabilis.
49. tenebrosa.	122. variicollis.
113. testacea Oliv.	4. variolosa Marsh.
testacea Marsh. (112).	142. venustula.
testacea Germ. (3?).	215. verrucicollis.
171. tetraspilota.	0. verrucipennis Clark.
178. tigrina.	0. verrucosa Marsh.
94. transversomaculata Clark.	0. vicina Boisd.
155. trifasciata Boisd.	134. virens.
72. trimaculata.	136. viridula.
128. tritaeniata Stål.	53. vittipennis Boh.
77. trivittata.	100. vulgaris.
210. tubereulata.	0. Wallacei Baly.
160. turbata.	4. Waterhousei Baly.
32. umbrata.	3. Wilsoni Baly.
91. umbrosa.	

